


KÜLÖNLENYOMAT.


**A Magyar Belorvosok Egyesületének
1941 május 28 és 29.-én megtartott
XI. NAGYGYŰLÉSÉN elmondta :
Dr. HÁMORI ARTUR (Szeged)**

Hozzászólások a Magyar Belorvosok Egyesülete 1941-iki ülésén



BUDAPEST, 1941





Dr. Hámori Artur (Szeged):

Went professzor elhangzott előadásával kapcsolatban a környéki keringés központi szabályozására irányuló agykísérleteit ismerteti. E kísérleteit úgy végezte, hogy kutyákon az agy egyes részeit fokozatosan eltávolította és közben vizsgálta a vérnyomás viselkedését és annak reflexes befolyásolhatóságát. Megállapította, hogy közvetlenül a IX. agyideg felett ejtett metszés után a vérnyomás lezuhan, tehát az erek tonusát megtartó vasomotor központ a nyúltvelő és a híd határán van. A vérnyomást 3 úton lehet reflexesen befolyásolni: a psychomotoros reflexek az agykéregből indulnak ki, a fájdalom ingerek a köztiagyban átfejtik ki hatásukat és a sinus reflex központja a hídban helyezkedik el.

Dr. Hámori Artur (Szeged) Mező Béla előadásához 3 pontban szól hozzá:

1. Az előadó szerint a periarteriás sympathektomia hatása azért nem tartós, mert hamarosan új idegek nőnek az átvágottak helyére. Emellett sokkal nagyobb jelentőséget kell tulajdonítanunk az erek ama képességének, hogy rövidesen visszanyerik tonusukat anélkül, hogy beidegzésük újra kifejlődött volna. Ha nyulakon a ganglion cervicale superius-t eltávolítjuk, az azonos oldali fül arteriái nagyon kitérnek, azonban kb. 3 hét múlva majdnem teljesen visszanyerik eredeti vastagságukat, bár a ganglion nem nő ki. Hasonlóképpen a vese periarteriás sympathektómiája után kifejlődnek a denerválás klinikai tünetei: bővizelés és vérnyomás csökkenés, azonban 3 hét múlva majdnem egészen visszafejlődnek, ámbár a vese üdőérének sorozatos metszetekben való feldolgozása szerint az ideges összeköttetés nem állott helyre.

2. Az előadó az időszakos érzéstelenítés módszerét ajánlja gyomorfekélyek kezelésére. Mi már a szegedi Belgyógyászati klinikán évek óta úgy kezeljük gyomorfekélyes

betegeinket, hogy azok minden reggel 100 cm³ 1%-os cocaineum novum hydrochloricum oldatot isznak meg, valóban igen jó eredménnyel; azonban a kezelésnek ez a formája kellemesebb, mint a szurásokkal járó időszakos érzéstelenítés.

3. A szerzőnek heveny vesegyulladás eseteiben időszakos érzéstelenítéssel elért látszólagos jó eredményeit (2 hetes gyógyulások) nem tudja elfogadni saját kísérletes eredményei alapján. *Korányi András*sal együtt tanulmányozta a periarteriás sympathektomiá hatását a *Masugi*-nephritisre, összehasonlítva megfelelő kontroll állatokkal a klinikai képet és féloldali denervatio esetében a 2 vese kórszövettani képét. Ezekből a vizsgálatokból kiderült, hogy a denerválás megakadályozza ugyan az anuriát, kedvezően befolyásolja a vérnyomásemelkedést, de az alapbetegség gyógyulása nem várható a beidegzés megszakításától.

Felelős kiadó: dr. Hámori Artúr (Szeged).

Kovács és Szegedi nyomda, Budapest, IX., Üllői-ut 31.